

Листок-вкладиш, що додається до упаковки: Інформація для користувача

ELOPRINE, 500 мг, таблетки *Inosinum pranobexum*

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він містить важливу для пацієнта інформацію.

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, або за вказівками лікаря або фармацевта.

- Зберігайте цей листок-вкладиш, можливо, вам необхідно буде прочитати його ще раз.
- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта.
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря або фармацевта, Див. п. 4.
- Якщо через 5-14 днів не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до лікаря.

Зміст: листка-вкладиша

1. Що таке препарат Eloprine і для чого він використовується
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Eloprine
3. Як приймати препарат Eloprine
4. Можливі побічні дії
5. Як зберігати препарат Eloprine
6. Вміст упаковки та інша інформація

1. Що таке препарат Eloprine і для чого він використовується

Eloprine містить діючу речовину інозин пранобекс, яка має противірусну дію та стимулює імунну систему.

Eloprine містить діючу речовину інозин пранобекс, яка пригнічує *in vitro* розмноження патогенних для людини вірусів з групи *Herpes*.

Показання до застосування препарату Eloprine

Як допоміжний препарат людям зі зниженим імунітетом, у разі повторних інфекцій верхніх дихальних шляхів.

Для лікування герпесу губ і обличчя, викликаного вірусом простого герпесу (*Herpes simplex*).

Eloprine можна застосовувати лише пацієнтам, у яких в минулому діагностовано інфікування вірусом простого герпесу.

Якщо через 5-14 днів не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до лікаря.

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Eloprine

У яких випадках не використовувати препарат Eloprine:

- якщо у пацієнта алергія на інозин пранобекс або будь-які інші інгредієнти цього препарату (перелічені в пункті 6); ознаки алергічної реакції можуть включати висипання, свербіж, утруднення дихання, набряк обличчя, губ, горла або язика;
- якщо у пацієнта є на даний момент напад подагри (сильний біль у суглобі з набряком і почервонінням шкіри, або ексудат у великих суглобах) або аналізи показали підвищення рівня сечової кислоти в крові.

Попередження та запобіжні заходи

Перед використанням препарату Eлоргіне проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом:

- якщо у пацієнта в анамнезі напади подагри або підвищення рівня сечової кислоти у крові або в сечі, оскільки препарат Eлоргіне може спричинити тимчасове підвищення рівня сечової кислоти в крові та сечі;
- якщо у пацієнта в анамнезі сечокам'яна хвороба;
- якщо у пацієнта порушення функції нирок; в цьому випадку лікар буде уважно контролювати пацієнта;
- якщо лікування тривале (3 місяці і більше), лікар рекомендує регулярний контрольний аналіз крові і контролювати функцію нирок і печінки;

Діти

Цей препарат не слід застосовувати дітям віком до 1 року.

Препарат Eлоргіне та інші лікарські засоби

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. Зокрема, слід повідомити лікаря про будь-який із перерахованих нижче препаратів, оскільки вони можуть взаємодіяти з

з препаратом Eлоргіне:

- препарати для лікування подагри (алопуринол або інші препарати);
- препарати, що збільшують виведення сечової кислоти, включаючи діуретики (які збільшують утворення сечі), наприклад фуросемід, торасемід, етакринова кислота, гідрохлоротіазид, хлорталідон, індапамід;
- препарати, що пригнічують імунну систему (так звані імунодепресанти, що застосовуються у пацієнтів з трансплантацією органів або при атопічному дерматиті);
- азидотимідин (лікарський засіб для лікування пацієнтів, інфікованих ВІЛ).

Вагітність і годування груддю

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати дитину, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей препарат.

Не приймайте Eлоргіне під час вагітності та годування груддю, якщо лікар не рекомендує інше. Лікар оцінить, чи переваги застосування препарату перевищують ризики.

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів

Малоймовірно, що Eлоргіне вплине на здатність керування транспортними засобами та експлуатації механізмів.

Препарат Eлоргіне містить манітол (E 421)

Одна таблетка Eлоргіне містить 160 мг манітолу, який може мати легку проносну дію.

3. Як приймати препарат Eлоргіне

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, або за вказівками лікаря або фармацевта. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта.

Дозу визначають відповідно до маси тіла пацієнта та тяжкості захворювання. Добова доза повинна бути розділена на рівні разові дози, які приймають кілька разів на день.

Дорослі, в тому числі люди похилого віку (старше 65 років)

Рекомендована доза становить 50 мг на кг маси тіла на добу.

Звичайна добова доза становить 6 таблеток (3 г) на добу (тобто по 2 таблетки 3 рази на добу).

Максимальна добова доза становить 8 таблеток (4 г) на добу (тобто по 2 таблетки 4 рази на добу).

Діти віком від 1 року

Рекомендована доза становить 50 мг на кг маси тіла на добу, розподілена на кілька рівних прийомів. Дітям, які не можуть ковтати таблетки, рекомендується застосовувати препарат у формі сиропу 250 мг/5 мл або 500 мг/5 мл.

Спосіб застосування

Препарат слід застосовувати перорально.

Таблетку слід запивати достатньою кількістю рідини. Якщо важко проковтнути таблетку цілком, можна подрібнити таблетку та розчинити у невеликій кількості води, щоб полегшити прийом.

Тривалість лікування

Зазвичай лікування триває від 5 до 14 днів. Лікування зазвичай продовжують протягом 1-2 днів після зникнення симптомів.

Застосування у дітей

Цей препарат не слід застосовувати дітям віком до 1 року.

Прийом більше рекомендованої дози препарату Elogrine

На сьогоднішній день випадків передозування не зафіксовано. У випадку будь-яких сумнівів або поганого самопочуття потрібно негайно звернутися до лікаря.

Пропуск прийому препарату Elogrine

Якщо ви пропустили дозу, прийміть її, як тільки згадаєте, якщо майже не настав час для наступної дози. Не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.

Припинення застосування препарату Elogrine

Якщо лікування припинити, очікуваний терапевтичний ефект може не бути досягнутий або симптоми захворювання можуть посилитися.

Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до лікаря або фармацевта.

4. Можливі побічні дії

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не у всіх.

Інші можливі побічні ефекти препарату Elogrine наведені нижче.

Дуже часті (трапляються у більше ніж 1 з 10 осіб):

- тимчасове підвищення рівня сечової кислоти в крові та сечі;

Часті (трапляються частіше ніж у 1 з 10 осіб):

- підвищення рівня печінкових ферментів або концентрації азоту сечовини крові;
- нудота з блювотою або без неї;
- біль в епігастрії;
- свербіж шкіри;
- висип на шкірі;
- головний біль;
- запаморочення;
- втома або погане самопочуття;
- болі в суглобах.

Не надто часті (трапляються у менш ніж 1 з 100 осіб):

- діарея;

- закріп;
- нервовість;
- сонливість або труднощі із засипанням (безсоння);
- збільшення об'єму сечі (поліурія).

Повідомлення про побічні ефекти

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря або фармацевта. Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо в Департамент моніторингу побічних ефектів лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних препаратів, Ал. Єрозолимські 181С

02-222 Варшава

Тел. : (22) 49 21 301

Факс: (22) 49 21 309

Веб-сайт: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта.

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку застосування цього препарату.

5. Як зберігати препарат Elogrine

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці.

Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на картонній упаковці та блістері після: „EXP”. Термін придатності означає останній день вказаного місяця.

Особливих інструкцій щодо зберігання препарату немає.

Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. Запитайте фармацевта, як видалити лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка допоможе захистити навколишнє середовище.

6. Вміст упаковки та інша інформація

Що містить препарат Elogrine

- Діючою речовиною препарату є інозин пранобекс (комплекс, що містить інозин солі 4-ацетамідобензойної кислоти з N,N-2-диметиламіно-2-пропанолом в молярному співвідношенні 1:3).
Одна таблетка містить 500 мг інозину пранобексу.
- Допоміжні речовини: манітол, картопляний крохмаль, повідон К-25, магнію стеарат.

Як виглядає препарат Elogrine та вміст упаковки

Препарат Elogrine випускається у формі довгастих двоопуклих таблеток від білого до світло-кремового кольору.

Упаковка містить 10, 20, 30, 50 або 100 таблеток у блістерах.

Відповідальний суб'єкт та виробник

Polfarmex S.A.

вул. Юзефув 9

99-300 Кутно

Польша (Poland)
Тел. : 24 357 44 44
Факс: 24 357 45 45
e-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Дата останнього оновлення листка-вкладишу: